

# Gitrasek®


Itraconazol / Secnidazol

Tratamiento combinado  
indicado en:<sup>5</sup>

Vaginitis  
por *Candida*



Vaginosis  
Bacteriana



Logrando atacar  
patógenos causales más comunes:<sup>5</sup>

*Trichomonas vaginalis*

*Gardnerella vaginalis*

Bacterias anaerobias

*Mobiluncus sp*

*Candida albicans*

# Gitrasek®

Itraconazol / Secnidazol

Sencilla posología<sup>5</sup>



2  
cápsulas

X



2  
veces  
al día

X



3  
días

Combinación eficaz contra  
las infecciones vaginales<sup>3,5</sup>



Reg. Núm. 388M2006 SSA IV



**Referencias:** 1. Montes OM, Payan M, Pérez AM. Comportamiento clínico epidemiológico de la infección vaginal en gestantes de dos consultorios. *Psiquiátrico Comunitario Docente Este. Garmagany, Cuba.* 2004;2. Hernández BJA, Vázquez AA, Ojeda RC, et al. Prevalencia de vaginitis mixta en mujeres latinoamericanas según la percepción de los médicos. *Preferencia, efectividad e inocuidad de clindamicina más ketoconazol.* *Ginecol Obstet Mex* 2008; 76 (11) 3. Pizzi R, et al. *Rev Obstet Ginecol Venez.* 2017;77(2): 100 -109. 4. Plummer EL, et al. Combined oral and topical antimicrobial therapy for male partners of women with bacterial vaginosis. *Acceptability, tolerability and impact on the genital microbiota of couples-A pilot study.* *PLoS ONE.* 2016;13(1): e0190199. 5. Información para prescribir **Gitrasek®.**

Información completa para prescribir disponible a su solicitud en: [dimed@chinoin.com](mailto:dimed@chinoin.com)  
No. de Entrada: 203300202C5845 No. de almacén: 93044




Si las  
infecciones  
vaginales  
**LIMITAN**  
a sus pacientes





Las infecciones vaginales son **la principal causa de consulta ginecológica** en mujeres adultas<sup>1</sup>

Las **infecciones vaginales mixtas** tienen una prevalencia hasta del **50%**<sup>2</sup>



El tener más de un agente causal en las infecciones vaginales, crea la necesidad de un **tratamiento combinado**<sup>3</sup>



Una de las principales causas de recurrencia es la **falta de tratamiento a las parejas sexuales** de las pacientes<sup>4</sup>



## En infecciones vaginales **MIXTAS**

### Eficaz reducción de los síntomas:<sup>3</sup>



Ardor



Flujo vaginal



Dispareunia



Mal olor




Disuria



Prurito

Sin interacciones medicamentosas con otros antimicóticos por lo que pueden **administrarse en conjunto con tratamientos locales**<sup>5</sup>



# Gitrasek<sup>®</sup>

Itraconazol / Secnidazol

Excelente **apego al tratamiento**:<sup>3</sup>

**98.9%**

de las pacientes cumplieron

**100%**

de las dosis<sup>3</sup>

Facilita el tratamiento de la pareja **evitando recurrencias**<sup>4,5</sup>

