

Naproxeno sódico / Paracetamol Tres problemas, una solución



- Eficaz efecto antipirético y analgésico en menor tiempo y por periodos más prolongados 1,2
- Potencializa el control de la fiebre, inflamación y dolor con una mayor seguridad y menos eventos adversos.³



Favorece:

- Drenaje de las trompas de Eustaquio y de los senos paranasales¹
- Normaliza la presión en el oído medio.¹
- Alivia la disfagia y odinofagia.¹



Naproxeno sódico / Paracetamol

Tres problemas, una solución

Presentaciones adecuadas para cada tipo de paciente^{4,5}



Presentación		Edad	Dosis	Horas	
Suspensión ⁴	Niños	2 - 3 años	2.5 mL	Cada 8 horas junto con alimentos (3 veces al día)	
		+ 3 años	5 mL		5
Tabletas ⁵	Adultos Niños	+12 años	2 tabletas como inicio de tratamiento	Posteriormente una tableta cada 6 a 8 horas	días
	Adultos mayores		1 tableta	Cada 12 horas	

REFERENCIAS: 1. Franco Abreu G, Gras A, Hernández S. et al. Uso de AINEs en infecciones de vías respiratorias altas. Rev Mex Pediatr 2010; 77 (Supl. 1); 59-S14. 2. Palma J, Villalpando J, Novoa G, et al. Bioavailability of two aral-tablet and two oral-suspension formulations of naproxen sodium/paracetamol (acetaminophen); Single-dose, randomized, open-label, two-period crossover comparisons in healthy Mexican adult subjects. Clin Ther, 2009;31 (2):399-410.3. Altman R. A rationale for combining acetaminophen and NSAIDs for mild-to-moderate pain. Clin Exp Rheumatol. 2004;22: 110-117.4. Información para Prescribir Amplia Neoseverin (IPPA) suspensión. 5. Información para Prescribir Amplia Neoseverin (IPPA) tabletas.

